BIOROC Heat
FERTILIZANTE FOLIAR

INGREDIENTES ACTIVOS

Nitrógeno:	5,9 %m/v
Fósforo:	3,1 %m/v
Calcio:	7,8 %m/v
Magnesio:	1,8 %m/v
Materia orgánica:	3,0 %m/v

USO

Fertilizante foliar

BIOROC® HEAT es un formulado balanceado con nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y materia orgánica, diseñado para fortalecer el desarrollo de la planta en condiciones de estrés. Su combinación de nutrientes esenciales y compuestos orgánicos favorece el equilibrio metabólico, mejorando la disponibilidad y el aprovechamiento de los elementos necesarios para el crecimiento vegetativo y productivo.

Gracias a su aporte de calcio y magnesio, promueve la firmeza estructural de los tejidos celulares, optimiza la actividad fotosintética y previene fisiopatías asociadas a deficiencias secundarias. Por su parte, el fósforo estimula el enraizamiento y la floración, mientras que la materia orgánica contribuye a mantener el vigor general del cultivo, mejora la expresión de su potencial productivo, favorece un desarrollo más uniforme y reduce la caída de estructuras reproductivas, permitiendo obtener plantas más fuertes, ciclos más estables y cosechas de mayor calidad y rendimiento.

MODO DE ACCIÓN

ll

BIOROC® HEAT actúa mediante la aplicación directa de nutrientes sobre la superficie de las hojas, permitiendo su absorción a través de la cutícula y, en menor medida, mediante estructuras de la superficie foliar. Una vez absorbidos, los nutrientes son incorporados a los procesos fisiológicos y metabólicos de la planta, contribuyendo al crecimiento vegetativo, la formación de tejidos, la actividad fotosintética y el desarrollo general del cultivo.

gg

La acción de **BIOROC® HEAT** se basa en el aporte equilibrado de sus componentes junto a la materia orgánica, elementos que cumplen funciones diferentes y aportan al desarrollo y nutrición de la planta.

MODO DE APLICACIÓN

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación al trabajar, vierta la cantidad requerida del producto lentamente, luego adicione el resto del agua hasta completar el volumen total requerido, y siga dando agitación. El pH recomendado para la mezcla de aplicación es de 4 a 6.

USOS Y DOSIS

Nombre común	Nombre científico	Forma y técnica de aplicación
Arroz	*Oryza sativa*	Una a dos aplicaciones distribuidas entre embuchamiento y 5% de emergencia de la panícula.
Banano y plátano	*Musa* spp	Aplicar para evitar los primeros síntomas de arrepollamiento al inicio y durante las épocas secas prolongadas.
Cítricos	*Citrus* spp.	Aplicar desde inicio de floración hasta la formación del fruto maduro.
Tomate	*Lycopersicum esculentum*	Aplicación desde inicio de floración y/o hasta aparición de deficiencias.
Cebolla	*Allium cepa*	Aplicar al inicio de la formación del bulbo o engrosamiento y hasta que comience maduración.
Piña	*Ananas comosus*	Aplicar antes y después de la inducción floral y durante la floración hasta la cosecha.
Aguacate	*Persea americana*	Aplicación como corrector de deficiencias. Desde el inicio de floración y hasta la cosecha.
Cucurbitáceas	*Cucurbitaceae*	Aplicación como corrector de deficiencias. Desde el inicio de floración y hasta la cosecha.
Melón	*Cucumis melo*	Aplicación como corrector de deficiencias. Desde el inicio de floración y hasta la cosecha.
Sandía	*Citrullus lanatus*	Aplicación como corrector de deficiencias. Desde el inicio de floración y hasta la cosecha.
Crucíferas	*Brassicaceae*	Aplicar al inicio de formación de la cabeza, repetir cada 15 días hasta la cosecha.
Frijol	*Phaseolus vulgaris*	Aplicar al inicio de floración y repetir cada 15 días.
Maní	*Arachis hypogaea*	Realizar al menos tres aplicaciones desde los 35 a los 65 días del establecimiento cultivo. Realizar las aplicaciones cada 12-15 días.
Mango	*Mangifera indica*	Aplicación como corrector de deficiencias. Desde el inicio de floración y hasta la cosecha.
Tabaco	*Nicotiana tabacum*	Aplicar desde el trasplante hasta cosecha.
Zanahoria	*Daucus carota*	Aplicar desde el inicio de engrosamiento y hasta cosecha. Repetir cada 15 días.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste. Oficentro Milano Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

BIOROC Heat
FERTILIZANTE FOLIAR

DOSIS PARA TODOS LOS CULTIVOS: 0,5 a 3,0 L/ha. en 200 L de agua.

FORMA DE APLICACIÓN: Foliar

INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los fertilizantes. No mezclar con sustancias alcalinas, soluciones a de base cobre, que contengan nitrato de calcio o sulfato de hierro. Se recomienda siempre realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos indicados en las dosis sugeridas.

AVISO AL COMPRADOR

Garantizamos que el contenido de este envase es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo con las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

PRESENTACIONES

200 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 200 L.

REGISTRO

Costa Rica: 13156

Formulador:
Inversiones Biodry Centroamérica, S.A.
País de origen: Costa Rica

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste. Oficentro Milano Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación