ARRASADOR 75,7 SG

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Glifosato sal de amonio 757 g/kg (75.7%)

Nombre Químico
Glifosato N-(phosphonomethyl)glycine

No. CAS
1071 – 83-6

FORMULACIÓN

Gránulos solubles

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Sólido
Color:	Blanco a amarillo claro
Olor:	Sin olor
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

ARRASADOR 75,7 SG es un herbicida sistémico no selectivo para el control de gramíneas y hojas anchas, que penetra a través de la cutícula de las hojas u otros tejidos verdes. Absorbido por el follaje con rápida translocación en toda la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

ARRASADOR 75.7 SG Aplicar vía terrestre, ya sea con bombas de espalda o mochila, así como aplicaciones con tractor. Para aplicaciones con aspersores de espalda, se recomienda un volumen de agua de entre 50 y 200 litros por Ha, utilizando boquillas de baja descarga como las TJ 800050, TJ 8001, TK 0.5 y TK 1. Para aplicaciones con tractor se recomiendan boquillas de mayor descarga, como TJ 8002, TJ 8003, TK 1 y TK 2 o equivalentes, con el fin de evitar taponamientos.

MODO DE APLICACIÓN

Calcular la cantidad de agua a usar acorde a la superficie que pretende proteger. Poner en el tanque de mezcla la mitad de agua a usar, adicionar la cantidad de **ARRASADOR 75.7 SG** de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregar el resto de agua. Evitar aplicar sobre malezas recién cortadas, pastoreadas o con polvo sobe el follaje.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Plagas a controlar	Dosis	Época de aplicación
PIÑA ***Ananas comosus***	Guarda rocío ***Digitaria sanguinalis*** Arrocillo ***Echinochloa* spp.** Zacate guinea ***Panicum maximun*** Pata de gallina ***Eleusine indica*** Verdolaga ***Portulaca oleracea***	1.5-2.0 kg/ha	Aplicación post emergencia a la maleza cuando tenga 2 a 3 hojas verdaderas o 30 días después de la siembra de piña. Usar 1500 L de agua/ha.
MAÍZ ***Zea mays***	Moriseco ***Bidens pilosa*** Mielcilla ***Talinum paniculatum*** Churristate ***Ipomea* spp.** Lengua de vaca ***Rumex crispus*** Kikuyo ***Pennisetum clandestinum*** Gamalote ***Paspalum fasciculatum*** Zacate guinea ***Panicum maximun*** Verdolaga ***Portulaca oleracea*** Tomatillo ***Solamun nigrum*** Arroz negro ***Oryza* spp.** Guarda rocío ***Digitaria sanguinalis*** Arrocillo ***Echinochloa* spp.** Pata de gallina ***Eleusine indica*** Siempre viva ***Commelina diffusa*** Zacate pará ***Brachiaria mutica***	0.5-1.0 kg/200-400 L de agua	Las aplicaciones deben realizarse durante la época de lluvias, sobre el follaje de las malezas que se encuentran creciendo vigorosas.
PALMA AFRICA ***Elaeis guineensis***			
FRIJOL ***Phaseolus* spp.**			
CAFÉ ***Coffea* spp.**			
CÍTRICOS ***Citrus* spp.**			
AGUACATE ***Persea americana***			
BANANO ***Musa* spp**			
MACADAMIA ***Macadamia ternifolia***			
SORGO ***Sorghum vulgare***			

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER

ARRASADOR 75,7 SG

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

50 g - 500 g - 1 kg - 5 kg - 10 kg - 25 kg

REGISTRO

Costa Rica: 870292

Formulador:
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.
Xinanjiang, Jiande City
Zhejiang Province, China

TITULAR DEL REGISTRO
INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica.

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 metros Oeste, Oficentro Milano, bodega 23 – San José

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
Interoc.custer@corpcuster.co

INTEROC
Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER