CURALANCHA 72 WP

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común
Mancozeb: 64 ,0%m/m
Cymoxanil: 8,0%m/m

Nombre Químico
Mancozeb: Manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt
Cymoxanil: 1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea

No. CAS
Mancozeb: 8018-01-7
Cymoxanil: 57966-95-7

FORMULACIÓN

Polvo mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Sólido
Color: Amarillo quemado
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Inflamabilidad: No es inflamable.
Explosividad: No es explosivo

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN

CURALANCHA 72 WP Este es un fungicida mezcla de ingrediente ditiocarbamato (mancozeb) con acción de contacto y efecto protector, y un ingrediente (cymoxanil) con acción protectora, curativa y erradicante, el cymoxanil es absorbido por el follaje y tiene actividad de contacto y sistémico local. En el hongo el mancozeb actúa como un inhibidor de la actividad enzimática y el cymoxanil es un inhibidor “multisitio” en procesos metabólicos de los hongos, principalmente pernosporales, que actúan en la germinación de las esporas, crecimiento micelial y formación de conidióforos.

RECOMENDACIONES DE USO

CURALANCHA 72 WP se puede aplicar con equipo de espalda, con equipo terrestre acoplado a un tractor, con un volumen de aplicación de 400-600 L por hectárea. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco. Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación. CURALANCHA 72 WP debe aplicarse en soluciones con pH (5 - 6) y dureza del agua (50 - 70 ppm). Indispensable adicionar coadyuvante siliconado, MAXICOVER.

MODO DE APLICACIÓN

Para preparar el caldo de aplicación, Hacer pre disolución del producto. En un recipiente mezcle la cantidad requerida de producto con agua hasta obtener una parte semilíquida, luego llene el tanque de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la dosis del producto y termine de llenar con agua limpia. El equipo y utensilios deben ser lavados con agua después de cada jornada por medio del triple lavado.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
PAPA *Solanum tuberosum*	Apagón o tizón tardío *Phytophthora infestans*	1,5-2,0 kg/ha 500 g/ 200 litros de agua	iniciar las aplicaciones con la aparición de los primeros síntomas presentas en los tallos principales de la planta. a los 10 y 20 días de edad del cultivo. Hasta 20 cm de altura del cultivo. Según infestación de las malezas

PERÍODO DE CARENCIA: 7 días.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común en la agricultura. No es compatible con productos alcalinos fuertes como Caldo Bordelés, Polisulfuro de calcio, aceites y permanganato de potasio.

AVISO AL COMPRADOR

El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del consumidor.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5

ATENCIÓN

PRESENTACIONES

Bolsas trilaminadas.
500 g, 1 kg

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic, 1 km al Sur y 900 m Oeste Oficentro Milano Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz/m

INTEROC
Pasión por la innovación

REGISTRO

Costa Rica: 5164

Formulador: INTEROC S.A

Km. 16.5 Vía a DauleGuayaquil - Ecuador
Tefl.: (593-4) 216-2608 ircamregulatorio@interoc.biz

TITULAR DEL REGISTRO

INTEROC CUSTER S.A.
Alajuela, Costa Rica

DIRECCIÓN:
Del cruce de la Panasonic,
1 km al Sur y 900 m Oeste
Oficentro Milano
Bodega 23 – Alajuela

TELÉFONOS:
(506) 2239-4298

WEB:
https://www.interoc.biz/m

INTEROC
Pasión por la innovación